

活海鲜必须得到照顾，以保证良好的品质！

首先，确保您从供应商处购买的鱼类和贝类是健康的，这样它们在您的鱼缸里会更容易保养健康。

别让鱼类和贝类在水缸里过度拥挤，鱼缸载畜量应该根据它们各自种类的需求，并根据您养鱼系统的容量！

良好的水质是健康鱼类和贝类必不可少的。这本小册子提供一些基本的福利信息，以更帮助您照顾鱼类和贝类。欲了解更多信息，请参阅各自的州政府网站。

- 确保您的鱼缸有充足的空气气泡。鱼类和贝类的数量越多，需要的空气也越多，请确保有需要的时候它们能够远离气泡。
- 鼓入空气不但确保缸水有足够的氧气，也有助除去鱼类和贝类释放的二氧化碳 (CO₂)。过多的二氧化碳会影响水质。
- 定期清理您的鱼缸和过滤器 - 缸水应该时时都清澈干净。
- 多数的鱼可以禁食一周，但有些贝类 (例如虾) 如果不喂就可能显示气盛的迹象。如果您需要喂鱼类和贝类，请确保废物不在缸内积聚导致鱼类和贝类患病。
- 缸水的酸度和碱度会改变。缸水的理想pH值 (水酸性或碱性的度量) 应该似于鱼类原来的水pH值。
- 淡水缸的水pH值不应低于6。
- 每天检查您的鱼缸，并立即清除任何患病，受伤或死亡的鱼类或贝类。

- 缸水，死鱼和死贝类的处置必须按照当地政府的規定。
- 决不可把任何化学品添加入有活鱼类或贝类的缸水。

不同种类的鱼类和贝类都需要不同的水属性，没有任和鱼类和贝类喜欢突然的变化！

- 不同种类的鱼类和贝类有不同的温度要求。有些喜欢温暖的水，有些喜欢偏凉的水 - 请参阅背页。
- 同样，某些鱼类和贝类喜欢淡水，有些喜欢咸水。有些喜欢在两者之间的盐度 - 请参阅背页。
- 没有鱼类或贝类喜欢缸水温度和盐度有突然变化。把活鱼类和贝类加入鱼缸之前，请确保鱼缸的温度和盐度是正确的。

人道屠杀鱼类和贝类！

- 活鱼类和贝类从鱼缸拿出就应该尽快屠杀。对鱼类合适的人道屠杀方法包括打击头部或扎透大脑。
- 无论使用何种方法，屠杀进程不应该超过10秒。

写方:
Panaquatic 健康解决方案私人有限公司
网站 (website): www.panaquatic.com

该工程的资金支持来自农业部的澳大利亚动物福利战略(AAWS)。珊瑚鳕鱼，尖吻鲈，小龙虾，南部岩石龙虾，西部岩石龙虾，虾，和塔斯马尼亚巨型螃蟹的照片来自FRDC/CSIRO

© PANAQUATIC 健康解决方案私人有限公司


PANAQUATIC

AUSTRALIAN
ANIMAL
WELFARE
STRATEGY

餐厅和零售商 饲养鱼类和贝类的指南

高档餐厅从福利的角度
提供优质的活海鲜




PANAQUATIC


FRDC
FISHERIES RESEARCH & DEVELOPMENT CORPORATION

鱼类的需求



水温需求



盐度需求

Coral trout (Plectropomus spp.) 红石斑 (花斑刺鲷)



20° - 22.5°C



倾向于咸水
(25 千分率 盐度)

Barramundi (Lates calcarifer) 澳洲肺鱼 (尖吻鲈)



20° - 22.5°C



倾向于淡水
(5 千分率 盐度)

Jade perch (Scortum barcoo) 宝石鲈 (澳洲宝石鲈)



15° - 20°C



淡水
(0 千分率 盐度)

Silver perch (Bidyanus bidyanus) 银鲈 (银锯眶鲷)



15° - 20°C



淡水
(0 千分率 盐度)

Murray cod (Maccullochella peelii peelii) 墨累鳕鱼 (虫纹麦鳕鲈)



15° - 20°C



淡水
(0 千分率 盐度)

Morwong (Cheilodactylus spectabilis) 唇指鲈 (耀唇指鲈)



10° - 15°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Parrot fish (Notolabrus tetricus) 鹦嘴鱼 (凶猛背唇隆头鱼)



10° - 15°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Eels (Anguilla species) 鳗鱼 (澳洲鳗鲡)



12.5° - 17.5°C



倾向于淡水
(5 千分率 盐度)

Mudcrab (Scylla serrata) 泥蟹 (锯缘青蟹)



20° - 25°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Painted crayfish (Panulirus ornatus) 花龙虾 (锦绣龙虾)



20° - 25°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Tiger prawns – Sea water (Penaeus monodon) 明虾 – 海水 (对虾)



18° - 22°C




咸水
(30-35 千分率 盐度)

Western rock lobster (Panulirus cygnus) 西岩龙虾 (天鹅龙虾)



14° - 18°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Tasmanian giant crab (Pseudocarcinus gigas) 塔斯马尼亚巨蟹 (巨大拟滨蟹)



10° - 15°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Southern rock lobster (Jasus edwardsii) 南岩龙虾 (刺岩龙虾)



10° - 15°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)

Abalone (Haliotis species) 鲍鱼 (鲍螺属)



10° - 15°C



咸水
(30-35 千分率 盐度)